

FICHA TÉCNICA



GBN

GBN Agro-químico
ALVARA Nº SILA/19/1729/DNI/202

+244 933453838 / 927992288

gelsonneto1@gmail.com

GBN PESHOP



Laycabov Amitraz

Indicações:

Laycabov é indicado para tratamento das sarnas demodécica e sarcóptica e controle de carrapatos em cães; sarnicida e piolhicida para ovinos e suínos; carrapaticida para bovinos.

Modo de Usar: Usar pulverizador manual ou motorizado, cuidando para que o jato tenha bastante pressão para penetrar debaixo dos pelos. A quantidade de calda para molhar 1 bovino adulto não deve ser inferior a 5 litros.

Cães: Diluir 4 mL do produto Laycabov em 1 litro de água (1 parte de para 250 partes de água) para o tratamento de sarna demodécica e sarcóptica ou diluir 2 mL do produto Laycabov em 1 litro de água (1 parte de Laycabov para 500 partes de água) para o controle de carrapatos.

Bovinos: Diluir 1 parte do produto Laycabov em 500 partes de água.

Para Médicos e Veterinários: O ingrediente ativo, embora de baixa toxicidade, quando introduzido no organismo causa depressão do sistema nervoso central, devendo ser administrado tratamento analéptico sintomático.

Precauções: Laycabov contém um composto do grupo químico diamidina, de baixa toxicidade. Contudo, deve-se observar os seguintes cuidados: Lavar bem o recipiente usado para preparar a solução; Não é aconselhável tratar os animais durante as horas de calor intenso ou chuva; Não deixar os cães tratados com o produto secarem ao sol ou com secador quente. Não deixar que o produto tenha contato com os olhos do animal e evitar que ele se lamba durante a secagem; Não aplicar o produto diretamente com as mãos. Usar luvas; Evitar o contato do produto concentrado com qualquer parte do corpo humano. Se isto ocorrer acidentalmente, lavar as partes atingidas com água e sabão várias vezes. A contaminação com o produto diluído na proporção recomendada é praticamente destituída de perigo, uma vez que sejam tomadas as medidas de remoção e limpeza indicadas; Não guardar ou aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos; Destruir as embalagens vazias. Em caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um Médico, neste ínterim caso tenha ocorrido ingestão acidental, provocar vômito, administrando por via oral, 1 colher de sopa de sal comum em 1 copo de água morna.

Período de carência em Bovinos:

Abate: O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 3 dias após a última aplicação.

Leite: O leite dos animais tratados não deve ser destinado ao consumo humano até 3 dias após a última aplicação.

Atenção: Antes de utilizar qualquer medicamento veterinário sempre leia as instruções que acompanham o produto (bula ou rótulo). Informações sujeitas a divergências entre rótulo ou bula e este conteúdo. Caso haja diferença entre as informações aqui apresentadas e rótulo ou bula, prevalecerá sempre a informação do rótulo ou bula que acompanha o produto. Sempre leia a bula antes de utilizá-lo. Consulte sempre um médico veterinário!